中西藥交互作用

中藥	西藥	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	處理方式
大黃	Warfarin sod. Tab. 5mg	降低warfarin療效	西藥療效降低	隔開服用
補陽還五湯	Warfarin sod. Tab. 5mg	中藥具抗凝血作用	作用加成	Monitor INR
桃仁承氣湯	Warfarin sod. Tab. 5mg	中藥具抗凝血作用	作用加成	Monitor INR
白芷	Warfarin sod. Tab. 5mg	中藥含香豆素 Furocoumarin	Warfarin作用加強	Monitor INR
白芷	Aspirin 100mg	中藥含香豆素 Furocoumarin	抗凝血作用加強	Monitor INR
天花粉	Acarbose 50mg	中藥具有降血糖作用	降血糖作用加成	Monitor INR

INR : International normalized ratio 國際標準化比值

中藥	西藥	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	處理方式
車前草	Warfarin sod. Tab. 5mg	中藥含維生素K會妨礙抗凝血劑作用	作用降低	避免並用
大黃	Furosemide 40mg	與西藥產生結合反應	喪失療效	隔開服用
大黃	Insulin Glargine 100 U/ml 10ml	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
山茱萸	Acarbose 50mg	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
丹參	Aspirin 100mg	使Aspirin蛋白結合率減少	西藥療效增加	隔開服用
丹參	Cholestyramine	中藥具有降血脂作用	作用加成	調整劑量

中藥	西藥	可能交互作用機轉	可能交互作用結果	處理方式
五味子	Aminophylline	酸鹼中和	降低療效	避免使用
白朮	Acarbose 50mg	中藥具降血糖作用	降血糖作用加成	調整劑量
甘草	Aspirin 150mg	胃酸 胃蛋白酶的分泌增加,刺激胃黏膜	加重潰瘍,甚至引起上消化道出血	避免使用